

Fièvre : exclu ou pas?

Note : Ce tableau ne remplace pas les recommandations ou le diagnostic d'un médecin. Il a été construit à titre informatif seulement pour les personnes travaillant avec les enfants qui doivent décider de garder ou non un enfant au service de garde lorsque la fièvre se manifeste durant la journée.

Situation	Recommandé d'exclure	Recommandé de NE PAS exclure
L'enfant a moins de 3 mois et il fait de la fièvre.	X	
L'enfant a plus de 3 mois et il fait de la fièvre.	Si la fièvre ne se contrôle pas ou que l'enfant ne va pas bien. Besoin de plus de surveillance. L'enfant de moins de 6 mois qui fait de la fièvre devrait être vu par un médecin.	Si la fièvre est contrôlable et que l'enfant va bien.
Vous constatez et mesurez la température de l'enfant, il fait plus de 38,5 °C rectale (37,5 °C axillaire). Vous appliquez le protocole d'administration d'acétaminophène du ministère et tentez de contrôler la fièvre en administrant l'acétaminophène si l'enfant est inconfortable.		
Une heure après l'administration d'acétaminophène, la fièvre monte toujours.	X Fièvre qui ne se contrôle pas, si l'enfant ne va pas bien.	
Une heure après l'administration d'acétaminophène, le chiffre sur le thermomètre ne descend pas, mais l'enfant va beaucoup mieux.		X Normal si la température est prise par voie rectale, elle change lentement, surveillance accrue.
Une heure après l'administration d'acétaminophène, le chiffre sur le thermomètre descend, mais l'enfant ne va pas mieux.	X La fièvre, à elle seule, ne pouvait expliquer le malaise de l'enfant. C'est alors son état général qui nous permet de prendre une décision d'exclusion.	
Une heure après l'administration d'acétaminophène, le chiffre sur le thermomètre descend et l'enfant va mieux.		X La fièvre qui incommodait l'enfant est disparue et son malaise aussi. Il peut suivre le rythme.
Une heure après l'administration d'acétaminophène, le chiffre sur le thermomètre ne descend pas et l'enfant ne va pas mieux.	X Le plus vite possible.	
L'enfant fait de la fièvre et a des éruptions cutanées.	X Besoin d'un diagnostic médical.	
L'enfant fait de la fièvre et a des vomissements ou la diarrhée.	X Il y a risque de déshydratation important.	
L'enfant fait de la fièvre et présente une toux importante ou a de la difficulté à respirer.	X L'enfant doit voir un médecin pour les difficultés respiratoires.	